

**家庭用園芸除草剤**

**バスタ<sup>®</sup>AL** ®=BASF社の登録商標

除草剤分類 **10**

有効成分  
 グルホシネート ..... 0.10%

登録番号：第24359号

性 状：淡青緑色澄明水溶性液体

毒 性：普通物\*

有効年限：3年

包 装：2.5ℓ×6本

\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

**■適用雑草と使用方法**

(2020年3月11日現在)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数																		
かんきつ りんご びわ キウイフルーツ	—	一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	100ml /㎡	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内																		
		多年生雑草						ぶどう なし おうとう かき もも 小粒核果類 ネクタリン	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	2回 以内	3回以内	多年生雑草	いちじく	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	3回 以内	2回以内	くり	多年生雑草	キャベツ はくさい	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)	3回 以内	3回以内
ぶどう なし おうとう かき もも 小粒核果類 ネクタリン		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)						2回 以内				3回以内												
		多年生雑草						いちじく		一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	3回 以内		2回以内	くり	多年生雑草	キャベツ はくさい	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)	3回 以内	3回以内	きゅうり なす ピーマン とうがらし類 トマト ミニトマト いちご	収穫前日まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)		
いちじく		一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)					3回 以内	2回以内																
くり		多年生雑草								キャベツ はくさい	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)	3回 以内	3回以内	きゅうり なす ピーマン とうがらし類 トマト ミニトマト いちご	収穫前日まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)									
キャベツ はくさい		一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)					3回 以内	3回以内																
きゅうり なす ピーマン とうがらし類 トマト ミニトマト いちご			収穫前日まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)																						

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
すいか ねぎ たまねぎ ブロッコリー ズッキーニ	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)	100mℓ /㎡	2回 以内	雑草 茎葉 散布	2回以内
だいこん			収穫45日前まで (雑草生育期は種前 又は畦間処理)				
ほうれんそう			収穫7日前まで (雑草生育期は種前 又は畦間処理)				
メロン レタス 非結球レタス かぼちゃ			収穫30日前まで (雑草生育期定植前 又は畦間処理)				
ごぼう			収穫前日まで (雑草生育期は種前 又は畦間処理)		3回 以内		3回以内
にんじん			収穫前日まで (雑草生育期萌芽前 又は畦間処理)		2回 以内		2回以内
アスパラガス			収穫30日前まで (雑草生育期植付前 又は畦間処理)		3回 以内		3回以内
さといも やまのいも			収穫14日前まで (雑草生育期挿苗前 又は畦間処理)		2回 以内		2回以内
かんしょ			収穫30日前まで (雑草生育期 畦間処理)		3回 以内		3回以内
こんにゃく			収穫21日前まで (畦間処理: 雑草生育期)		2回 以内		3回以内 (萌芽前は 1回以内、 萌芽後は 2回以内)
ばれいしょ			は種前 (雑草生育期)		3回 以内		3回以内
豆類(種実、ただし、 だいずを除く)			定植5日前まで (雑草生育期)				
			収穫28日前まで (畦間処理: 雑草生育期)				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
だいず	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	100mℓ /㎡	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)				
			定植5日前まで (雑草生育期)				
			収穫28日前まで (畦間処理: 雑草生育期)				
は種前 (雑草生育期)							
は種後出芽前 (雑草生育期)							
定植5日前まで (雑草生育期)							
収穫14日前まで (畦間処理: 雑草生育期)							
は種前 (雑草生育期)							
定植前 (雑草生育期)							
収穫前日まで (畦間処理: 雑草生育期)							
さやいんげん さやえんどう 実えんどう							
たけのこ		摘採7日前まで (雑草生育期 畦間処理)					
茶		雑草生育期 畦間処理 (草丈20cm以下)	3回 以内	植栽地 を除く 樹木等 の周辺 地に雑 草茎葉 散布	3回以内		
花き類・観葉植物		雑草生育期					
樹木類		雑草生育期					
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	多年生雑草					
桑	—	一年生雑草	雑草生育期 春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前		雑草 茎葉 散布		

## △ 効果・薬害等の注意

- 本剤は土壌に落下すると速やかに不活性化し、効果を発現しないので薬液が雑草の茎葉全体に均一にかかるように散布する。また、雑草が大きくなりすぎると効果が低下するので時期を失しないように散布する。
- 散布後 6時間以内の降雨は効果を減らすことがあるので、天候をよく見極めてから散布する。
- 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散しないよう散布する。特に、野菜類の生育期畦間散布で使用する場合は作物にかからないように十分注意して散布する。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に対しては、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。

## △ 安全使用上の注意

- 体調のすぐれない時は散布しない。
- 誤飲などのないように注意する。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験でフェノバルビタール製剤の投与が有効であると報告されている。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣等を着用する。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔等を石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意する。
- 水源池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
- 容器等の洗浄水は河川等に流さず、空容器は圃場等に放置せず、環境に影響を与えないよう3回以上洗浄してから適切に処理する。